

羽島市民病院 コミナティ筋注[®] 副反応アンケート結果

接種数：630人


回答数：377人

回答者：病院職員及び消防職員


新型コロナワクチンを接種した病院職員及び消防署職員を対象として「副反応アンケート」を実施し、その回答を基に、副反応と疑われる事例を集計しました。

接種との因果関係が証明されたものではありませんので、その点をご留意いただいた上で参考としてください。


男女比




年齢



接種部位痛（1回目接種時）




接種部位痛（2回目接種時）




無し
痛みを感じるが特に気にならなかった
痛みを感じて鎮痛剤を1回以上服用した
痛みを感じて日常業務に支障が出た

発熱（1回目接種時）




無し
36.5 以上～37.0 未満
(平熱より高い場合のみ)
37.0 以上～37.5 未満
37.5 以上～38.0 未満
38.0 以上～38.4 未満
38.5 以上～39.0 未満
39.0 以上


発熱（2回目接種時）



頭痛（1回目接種時）




頭痛（2回目接種時）




無し
薬剤治療を要さない
頭痛薬剤治療を要する、又は日常生活の一部に困難が生じる
日常生活に支障をきたす
活動・動作不能

全身倦怠感（1回目接種時）




全身倦怠感（2回目接種時）




無し
日常感じる疲労より軽度の疲労
薬剤治療を要する、又は日常生活の一部に困難が生じる
日常生活に支障をきたす
活動・動作不能

日常業務・仕事への影響（1回目接種時）




日常業務・仕事への影響（2回目接種時）




全く影響なかった
症状はあったが日常業務・仕事に影響は無かった
症状はあったが薬剤を服用することにより日常業務・仕事に影響は無かった
症状があり日常業務・仕事に影響した（服薬の有無は問わない）

副反応により何らかの薬剤を服用したか

(1回目)



(2回目)



使用頻度が高かった薬剤
ロキソプロフェン、アセトアミノフェン、イブプロフェン