

定期接種の接種可能な期間 定期接種の標準的な接種方法 ← 定期接種の標準的な接種期間

○ 定期接種の最終期限

※標準的な接種方法で実施できない場合は、「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。

	ワクチンの	回数	1 カ月	2カ月	3カ月 /	4 カ月	5カ月 /	6カ月 /	7カ月 /	8 カ月	9カ月	10 カ月	11 カ月	1 ##	2 歳	3 歳	4歳	5歳	6 ***	7 ***	8歳	9 ***	10 歳	11 歳	12 歳	13歳	14歳	15歳	16	予診票 配布時期						
B型肝炎	注射不活化	30	Г	1	2		"			3	07			前日		5	>																			
		ロタリックス	2	倒接和	がしています。	ら宝 (1 E	回目が	ら13 上 生24	39日以 上 1週OE	XEO.	、27	日以. をあけ	上の間けて1回	関をを到接種	bit C																					
ロタウイルス 2つの中から 1種類を選択	経口生	2回 ロタテック 3回		1	2	3			32週 後まて			ㅁ스	 接種に アリック アテック	クスの	D場合	は、出	3生24	週OE	∃後ま	での	』に2	7日以	上の間	 隔をあ	あけて	 	↓ 経□± □投	\$5 5		出 生 の 翌						
				<u>0</u>	2	3							4					7歳	6ヵ月 前日		3	>								出生の翌月に順次郵送						
5種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ・Hib)	注射 不活化	40		初	回接科	[は、:	20日	から!	56日	まで	の間隔	をあ	 まで けて3 まで	回接和	重	 	回接	種												·						
小児の 肺炎球菌	注射不活化	40		271	2		生後で	2 to F	In S	± 144.7	7.80		a までに	4 RBh4			5歳の 前E	誕生! 3まで)															
				初	回接租 加接租	は、質は、	27日初回招	以上	の間隔	をあ	ナて、	1歳(の誕生をあり	日の前	前日ま 2ヵ月	から1	5ヵ月 上 5歳∉	の前 上 ご誕生	日の	: C1[回接種															
Hib (ヒブ)	注射 不活化	40		初	回接和回接和	重は、	278	から	56日:	までの	D間隔	をあげ	目まで けて1 ii 月まで	歳の説	E生日 (の前E あけて	までに	日ま [*] 二3回 発種																		
4種混合 (シフテリア・百日せき ・破傷風・ボリオ)	注射 不活化	40		1	1120	1 期初 0日かり	556	日まて	での間	隔をは	カけて	3回#)誕生 E		日まで			7歳6	あ月に 前日言	こなるまで		>														
	33-64				18	1 期追り カラス ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン	までの	種は、	第1をあた	期初[けて1 	回接種回接種	(3)	(回) 終	了後	12ヵ)	月から								1		13歳	数の誕	生日の								
第2期DT (ジフテリア、破傷風)	注射 不活化	10																	1 自	 1歳が か日ま	から12 でに1	2歳の 回接和	誕生E 重	Bの						11歳の誕生日の 翌月上旬に郵送						
BCG	注射生	1 🗆		[生後5前日ま	うヵ月; までに	から生 1回接	E後8 接種	力月	こなる	5		1歳の前に	日まて																乳児健診時に 配付						
麻しん風しん (1期/2期)	注射生	20										1 該	期: 歳から 注日の 回接種	D前日	<u> </u>		2 年1	期 : 長児 回接和	の年度重	関内に										【1期】 10ヵ月児健診時に 配布 【2期】						
															2															「年長児になる年に 郵送						
水痘	注射生	20					初	回を	51歳3 1回接 あけて	種し、	6カ	目から	までに 512ヵ 	 .月の			の誕生	c 												10ヵ月児健診時に 配布						
日本脳炎 (1期、2期)	注射不活化	40	17	児は	、牛後	6 6カ月	に渡船)接種	ー 存する 可能で 課に	 す。			1期		445.0		→ (T _c	7歳6ヵ でる前E			④	2其			競の調節日	まで	 の 		【1期】 3歳の誕生月に郵送						
					合わt 	わせください 9年4月1日以		前に生まれ			6E 1其 初回	6日から1期追加初回終了		28日の間隔 は4歳から5 後おおむね 		5けて2 0誕生E の間隔		種 日まっ ナて1	でに 回接種 I	طلل	 	10	期は9歳に 0歳の誕生 回接種	延生日	の前に	i日まで 		ニュー		【2期】 ・9歳の誕生月の翌月 上旬に郵送						
		サーバリックス				.,,,,,								3.30,703											1 <u>2</u>		7									
	注射不活化	(2価) 3回	中	学14	キ生だ	からる	高校1	年生	的な Eの女 望がな	(子										11 = 0	月の間を担ける	から6	2回接	の間隔	た後、 をあ!	ナて		1	高校 1	 中学1年生になる年に						
フウ呱がん		ガーダシル (4価) 3回		※令和4年度から令和6年度に接種を開始した平成9年度生まれから平成 20年度生まれの女子は、令和8年3月末まで接種可能 2ヵ月の間隔で 目の接種から6 3回目を接種																		生に相当する		郵送 (小6の女子で接種を ご希望の方はお問い合 わせください)												
子宮頸がん 3つの中から 1種類を選択		シルガード (9価) 2回 または 3回	$\times t$	▶1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(2回接種) ただし、1回目から2回目の接種間隔が5ヵ月未満である場合は3回目の接種 が必要です。													ら6 接種		【①2 年 度 ※ 平成9年4月2日~ 来 平成24年4月1日生まれ																	
			• 1	◆1回目の接種を15歳になってから受ける場合(3回接種)												10	2ヵ月の間隔で2回接種した後、1回 目の接種から6ヵ月の間隔をおいて 3回目を接種																			